



RETTORIA SANITARIA REGIONALE

ASL
ROMA BREGIONE
LAZIO**Azienda USL RM B**

Sede legale:
Via Filippo Neda, 55 00157 Roma
Tel. 0641431 - Fax 0641433220

Dipartimento di Prevenzione
Direttore Dott. Giuseppe De Angelis
U.O.C. Servizio di Igiene e Sanità Pubblica
Direttore Dott. Fabrizio Magrelli
V.le B. Bardinazzelli 8 - 00155 Roma
Tel. 0641434951/75 Fax 0641434637

OSSIURIASI

Cenni clinici - E' una comune infestazione intestinale da vermi (elminti), che spesso decorre senza sintomi. Si presenta di solito con prurito anale, disturbi del sonno, irritabilità ed a volte infezioni della cute abruata.

La diagnosi viene fatta tramite l'applicazione di nastro adesivo trasparente alla regione anale e la successiva osservazione al microscopio per la ricerca delle uova. Le femmine dei vermi a volte possono essere rinvenute nelle feci.

Diffusione - E' diffusa in tutto il mondo e colpisce tutte le classi socio-economiche. E' l'infestazione elmintica più diffusa e colpisce soprattutto i bambini della fascia scolare e prescolare, ma anche gli adulti, specialmente quelli a contatto con i bambini affetti. Colpisce esclusivamente l'uomo, quindi il contatto con gli animali non è mai a rischio.

Modalità di trasmissione - Per ingestione diretta delle uova infettanti oppure indirettamente attraverso abiti, effetti lettercci, cibo o altri oggetti contaminati dalle uova del parassita. E' possibile anche la trasmissione attraverso la polvere, nelle case o nelle istituzioni dove l'infestazione è massiccia.

Periodo d'incubazione - Il ciclo vitale richiede dalle 2 alle 6 settimane per essere completato.

Periodo di contagiosità - Per tutto il periodo durante il quale le femmine depongono uova nella regione anale. Le uova possono rimanere infettanti nell'ambiente di solito per circa 2 settimane.

Misure preventive:

1. Scrupolosa igiene personale, in particolare lavaggio delle mani prima di mangiare o preparare il cibo. Mantenere corte le unghie: non mangiarsi le unghie e non grattare la regione anale.
2. Curare adeguatamente i casi di infestazione
3. Bagni quotidiani o meglio la doccia, al mattino
4. Cambi frequenti della biancheria personale e del letto
5. Eliminare ogni giorno la polvere dagli ambienti

Cosa è necessario fare quando vi è un caso in famiglia o nella scuola:

1. Isolamento: non è necessario isolare il malato.
2. Disinfezione concomitante: cambiare quotidianamente le lenzuola e la biancheria intima della persona infetta e lavarle in lavatrice utilizzando il ciclo caldo. Usare pigiami chiusi. Eliminare quotidianamente la polvere dalle stanze da letto e dalle aule scolastiche, per diversi giorni dopo il trattamento.
3. Tutti i membri di una famiglia dove si è verificato un caso dovrebbero essere esaminati ed eventualmente trattati. I bambini che frequentano la stessa classe di un caso, soprattutto se presentano i sintomi della malattia, devono recarsi dal pediatra per la prescrizione del test specifico per la diagnosi della malattia.
4. Terapia specifica: con prodotti consigliati dal medico, a base di vari agenti vermifughi.